

学点本事搞养殖

E-mail: 8101093@163.com 热线电话: 8101093



本版主持人: 小状元

关于养好母猪的科普文章,本刊编发了好几篇。养好母猪,似乎是老生常谈,但却可常谈常新。本版头条《养好母猪的关键四步骤》,重点突出,易懂易记,可操作性很强。时下,市场上土鸡和饲料鸡价格差距大,正确识别土鸡,是消费者应该掌握的必要知识。在这里,请大家看一看市畜牧研究所有关专家的文章,从外貌、风味和营养等方面认识土鸡。盛夏炎热,请养殖户特别重视《夏季流行鱼病的防治》。

水产知识

夏季流行鱼病防治

一、车轮虫病

每年5月至8月,主要危害的是鱼苗、鱼种阶段,以3厘米以下的鱼苗死亡率最高。

A、症状:病鱼分泌大量黏液,鱼体上车轮虫较密集的部位出现一层白霜;危害下塘10天左右的鱼苗,成群沿塘狂游,呈“跑马”现象,鱼体消瘦。B、防治办法:①用生石灰彻底清塘,杀灭底泥中的病原。②用0.7ppm的硫酸铜和硫酸亚铁合剂(5:2)全池泼洒。③用敌百虫或依维菌素全池泼洒。

二、小瓜虫病

每年3月至5月和8月至10月是小瓜虫病的流行季节,15℃至25℃的水温是小瓜虫繁殖的适宜水温,主要危害夏花鱼种和越冬鱼种。

A、症状:病鱼的皮肤、鳍条和鳃瓣上,肉眼可见白色小点;鳃上大量寄生,黏液增多,鳃小片被破坏。B、防治办法:(1)预防:①用生石灰彻底清塘。②用干辣椒粉和生姜各250g/亩煮水全池泼洒。注意:不能用硫酸铜或食盐等治疗。③合理掌握越冬密度,放养时进行鱼体消毒,防止小瓜虫传播。(2)治疗方法:1.生姜3ppm、辣椒粉0.5ppm,先将生姜捣烂,加入辣椒粉混合煮沸半小时,全池泼洒。2.苦参、雷公藤、生姜(1:1:1)9ppm全池泼洒。3.观赏鱼可降温到8℃以下,8小时可以治愈。4.硝酸亚贡0.15ppm。

三、草鱼出血病

病原是鱼呼吸链病毒,每年6月至9月是主要流行季节,主要危害草鱼。

A、症状:主要有:①“红肌肉”型,撕开病鱼的皮肤或对准阳光或灯光透视鱼体,可见皮下肌肉充血现象,有全身充血和点状充血;②“红鳍红鳃盖”型,病鱼鳍基、鳃盖充血,常伴有口腔充血;③“肠炎”型,病鱼肠道充血,常伴有松鳞,肌肉充血。B、防治方法:①注射灭活疫苗。②每100kg鱼每天用0.5kg至1.0kg的大黄、黄柏、板蓝根,拌入饲料或制成颗粒投喂,连喂7天,能起到很好的预防作用。

(上饶县委农工部 谢庆华)

养殖技巧

养好种母猪的关键四步骤

养好种母猪,是养殖业中的重中之重。俗话说:“公猪好好一坡,母猪好好一窝。”种公猪不可能每户都养,种母猪则不同,大多数养殖户都养有母猪,有的养两头、三头,专业的养殖场则养得更多。现就农村散养户对种母猪的饲养管理谈一点个人的实践经验。

1.后备母猪的前期管理。选作后备母猪的仔猪,在前5个月内必须给予营养全面的饲料,促使仔猪有一个健康的身体。5个月后控制饲料,保持中等体膘,易于发情受孕。母猪在第一次配种前必须进行杀虫、免疫接种、清肠等,发情后方可配种。

母猪8月至10月龄时如不发情,可肌注催情针,注射后发情不能配种,待第二次发情时方可配种。配种后必须做好记录,注明配种日期、预产期,以便于饲养管理。配种后的母猪必须保持七八成膘情。过肥身

体笨重,易压死仔猪;过瘦易产弱崽、死崽,并出现无乳或少乳,新生仔猪易患病、体质差、死亡率高。

2.母猪孕期管理。为确保仔猪强健,必须做到以下几点:①临产前1个月左右,给母猪饲喂未满月仔猪的粪便3天,临产前一两周左右再喂3天,可有效控制新生仔猪的黄白痢、水肿病。必须注意的是,粪便不能来自用过消毒剂的舍内,新生仔猪有病也不会传染母猪,可以放心使用。②不用粪便时,可以用含铁的制剂给母猪注射,配种后每月注射1次,每次30毫升至50毫升即可。③也可用中药加入饲料中,方法是:当归、川芎、熟地黄、白芍、黄芪、党参、枳壳、陈皮各10克,将以上药研末1次用完,每月1次。后两种方法,不但能有效控制新生仔猪的黄白痢、水肿病,还能促使仔猪个头均匀、大小一致,还能有效控制仔猪

的疾病。④母猪临产易便秘,临产一周内可连续使用硫酸钠(口服)。每次饲喂时,在饲料中加入60克硫酸钠,即可有效地控制便秘。

3.母猪哺乳期的管理。母猪产后3天内,必须给母猪注射1次40毫升的土霉素注射液,这样既有利于母猪身体的恢复,又能起到对子宫、产道的消炎作用。产后18天至20天,除哺乳外,必须用全价饲料给仔猪开食,为断奶做准备。哺乳和补料到35天时,仔猪可以断奶。断奶后4天至5天,母猪开始发情,此时又可以配种。配种后又进行下一个循环。

4.母猪预产期的计算。在正常情况下,母猪怀孕时间为114天。计算方法是3加3天,再加3。即月份上加3,又加上3周(21天),再加上3天即是预产时间。例如2月8日配种,月份上加3,就是5月8日,再加上3周,就是5月29日,再加上3天,就是6月2日,月份的大小则应补齐30天计算。(钱正华)



安远县版石镇周屋村农民叶金原来在广东务工,于2008年9月返乡创业,在家乡投资40万元创办了养猪场。现有母猪存栏70余头,肉猪200多头。图为叶金在给仔猪防疫。陈声年 郑敏 摄

盛夏喂猪技巧

猪的汗腺不发达,脂肪较多,体内热量散失较困难。因此,每当盛夏来临,猪的食欲大大减退,消瘦很快。据试验,猪在15℃至25℃时,食欲最旺盛,增量最快。而在盛夏,白天的温度一般都在30℃以上,这对

猪的食欲有很大的影响。夏天的中午,猪吃得最少,有的不吃不喝也不动弹。怎样来解决这个问题呢?方法是:在每天晚上休息前,可在猪的食槽添足食料,供猪备用。因为晚上气温一般可降到20℃左右。因此猪感到凉爽舒适,便起身活动和觅食,而且吃得很香甜。白天应注意给猪防暑降温,多喂稀食,并在食料内加些食盐、皮硝、麸皮等去火的添加剂及药物。这样猪会迅速增膘,安全度过盛夏。(彭良龙)

巧治疝气有新方

消疝1+1:双重作用,治疝气无需手术

疝气是老人及小孩易发的常见病,是在下腹部、大腿内侧出现一个较为柔软肿物,有的还会掉到阴囊里面,这就是常说的“小肠气”。有时会引发巨痛,疝气前期平卧能自行缩回去。如果延误了最佳治疗时机,若越掉越大,可形成嵌顿或肠梗阻、坏死感染的危险,严重影响小孩发育。所以不论小孩或老人,得了疝气千万不能大意。

传统疝气治疗面临两大难

以前疝气患者大多只知采用开刀的方法,然而多年来开刀所面临的问题越来越多。一是:小孩不懂事。开刀后,常哭闹好动,伤口不好愈合,小孩遭罪,还有手术时全身麻醉往往对大脑有害,再是手术容易割到小孩的精索,影响生育而遗憾终生;二是:老年人,生理机能下降,开刀后大伤元气,免疫力下降常易患病。往往是小手术引发大麻烦。再是有心脏病、高血压、气管炎、糖尿病等疝气患者就不能开刀。还常有患者开刀后,过一段时间另一侧又掉下来了。面对这两种弱势病人的疝气该怎么办呢?患者及家人一直

期望有一种既能治好疝气,又不伤害身体的治疗方法。

疝气治疗有了新突破

消疝1+1的研发,使疝气患者不再忧心忡忡,他们有告别开刀带来的伤害与痛苦。消疝1+1聚集了药物治疗疝气的精华,运用中医内病外治的理论,采取药疗加磁疗相结合的方法。有效成分通过穴位(神阙穴)经络渗透给药;经肚脐直接扩散到静脉网、腹下动脉群而进入体循环,增强脏器功能,补中益气,强肌健骨,促进疝内容物回缩,环口合并。同时结合药物疝气带使用,标本兼治。使用方便,一天一贴,无副作用,按疗程使用,康复后不会再掉下来。

消疝1+1的全面推广,使无数患者感受到了只须贴贴肚脐就能解决疝气问题,深得患者及家人好评。使众多患者既少花钱,少受罪,不受损伤治好了疝气。所以这种方法被推荐为老人、儿童疝气患者的首选。

各县可办理免费邮寄 货到付款

康复咨询:8841407 指定销售:赣州市稻香村大药房(营角上与文明大道十字路口)

土鸡与饲料鸡的区别

赣州市畜牧研究所 郭添福 郭礼荣

随着人民生活水平的不断提高,消费者越来越青睐绿色食品,对食品的风味、营养要求也越来越高。由于土鸡肉质鲜美,营养丰富,无公害污染,属绿色食品,近年来深受人们青睐,价格不断攀升。而在市场上要识别土鸡应把握以下三个方面:

一、外貌

1. 体形

土鸡体形一般较小,外观清秀,身躯狭长、紧凑,胸腿肌健壮。小腿分无羽毛附着与有羽毛附着两种。

饲料鸡躯体较大,样子笨拙,腿长脚粗,小腿一般无羽毛附着。

2. 鸡冠

土鸡成年后,鸡冠红而鲜艳,尤其要下蛋时,红得如鲜血。公鸡冠大而红,母鸡冠长不太大。

母鸡饲料鸡鸡冠大小趋于一致,淡红显得失血色。

3. 头部

土鸡头小,嘴不用断喙(把嘴巴前的尖锐部分截掉),尖锐且磨出光泽,会用嘴啄人。

饲料鸡头大,嘴一般断喙(防止小鸡互相伤害及进食方便),一般不啄人。

4. 腿

土鸡相对饲料鸡脚要短、小、细,较瘦无肉,但结实且硬。脚颜色以黄色居多,也有青色、黑色、白色等,一般一批土鸡脚的颜色不一致。爪尖磨得比较光滑。脚上、脚底皮肤多磨出老茧,脚皮肤粗糙,颜色相对较深。

饲料鸡脚更大、粗,较肥有肉。脚颜色以黄色、黑色居多,一般一批饲料鸡脚的颜色是一致的。爪子较土鸡尖锐且易折断受损。脚上无老茧,脚皮肤光滑、细腻,颜色相对较浅。

5. 羽毛

土鸡羽毛结构紧凑光滑,光亮整齐,土鸡羽毛颜色多样,异彩纷呈,一批土鸡中羽毛颜色多不一样。成年土鸡从其身上拔毛,羽杆内无毛囊液,不带血。母鸡翘尾,公鸡的尾巴呈镰刀状。

饲料鸡羽毛颜色单调,多为白、黑、麻、黄,一批饲料鸡中往往羽毛颜色一致。羽毛一般松散,无光泽,毛色晦暗。饲料鸡出售时,羽毛还在生长期,从其身上拔毛,羽杆内多有毛囊液,带血。

6. 皮肤

土鸡皮薄、紧致,毛孔细,呈网状排列。肤色偏黄,皮下脂肪分布均匀。

饲料鸡则皮厚、松弛,毛孔较粗。皮肤光洁度较差,颜色偏白。

二、口感、风味

土鸡有一股天然浓郁的鸡香味,且不易煮熟。肌肉结构紧,上口香,不是特别嫩但有韧性,味道鲜甜,骨头硬,皮薄,油脂少。鸡汤透明澄清,脂肪团聚于汤汁表面。

饲料鸡则肉汤较浊,表面脂肪团聚较少,口感较差。

三、营养价值

与饲料鸡相比,土鸡营养更佳,含高蛋白、氨基酸、微量元素和各种营养元素,脂肪含量较低,无药物残留,是儿童、孕妇、老人的首选。